Disciplina: Química

Prof. Yandrio Martins

Assunto: Cálculo de constante de equilíbrio (sistemas entrando em equilíbrio)

01. (UFMG-MG) Quando um mol de amônia é aquecido num sistema fechado, a uma determinada temperatura, 50% do composto se dissocia, estabelecendo-se o equilíbrio:

A soma das quantidades de matéria, em mol, das substâncias presentes na mistura em equilíbrio é:

- a) 3,0
- b) 2,5
- c) 2,0
- d) 1,5
- e) 1,0

02. (PUC-RS) Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação:

Em um recipiente de um litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio; o número de mols de trióxido de enxofre medido foi de 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é

- a) 0,53
- b) 0,66
- c) 0,75
- d) 1,33

03. (FUVEST-SP) N_2O_4 e NO_2 , gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio, como indicado:

Em uma experiência, nas condições ambientes, introduziu-se 1,50 mol de N_2O_4 , em um reator de 2,0 litros. Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO_2 foi de 0,060 mol/L. Qual o valor da constante K_c , em termos de concentração desse equilíbrio?

- a) $2,4 \cdot 10^{-3}$
- b) $4,8 \cdot 10^{-3}$

- c) $5,0 \cdot 10^{-3}$
- d) $5,2 \cdot 10^{-3}$
- e) $8,3 \cdot 10^{-2}$

04. (FUVEST-SP) Um recipiente fechado de 1 litro, contendo inicialmente, à temperatura ambiente, 1 mol de I_2 e 1 mol de H_2 , é aquecido a 300 °C. Com isto, estabelece-se o equilíbrio:

cuja constante é igual a $1,0 \cdot 10^2$. Qual a concentração, em mol/L, de cada uma das espécies $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{I}_2(\text{g})$ e $\text{HI}(\text{g})$ nessas condições?

- a) 0, 0, 2
- b) 1, 1, 10
- c) 1/6, 1/6, 5/3
- d) 1/6, 1/6, 5/6
- e) 1/11, 1/11, 10/11

05. (UNIALFENAS-MG) O valor da constante de equilíbrio, em concentração, da reação de esterificação, em meio alcoólico, entre 1 mol de etanol e 1 mol de ácido acético, na temperatura T, é igual a 4. Dada a reação em equilíbrio:

o número de mols do éster obtido no equilíbrio, na temperatura T, é aproximadamente

- a) 3/4
- b) 2/3
- c) 1/3
- d) 1/4
- e) 1/2

06. (UFPI-PI) Um método proposto para coletar energia solar consiste na utilização desta energia para aquecer a 800 °C trióxido de enxofre – SO_3 – ocasionalmente a reação:

Os compostos SO_2 (g) e O_2 (g), assim produzidos, são introduzidos em um trocador de calor de volume corresponde a 1,0 L e se recombina produzindo SO_3 e liberando calor. Se 5,0 mols de SO_3 sofrem 60% de dissociação nesta temperatura marque o valor correto de K_c :

- a) 1,1
- b) 1,5
- c) 3,4
- d) 6,7
- e) 9,0

07. (ITA-SP) Num recipiente de volume constante igual a 1,00 dm³, inicialmente evacuado, foi introduzido 1,00 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. O recipiente foi mantido a 227°C e, no equilíbrio final, foi verificada a existência de 33,4 g de gás cloro. Qual das opções a seguir contém o valor aproximado da constante (K_c) do equilíbrio estabelecido dentro do cilindro e representado pela seguinte equação química?

Dado: $\text{Cl} = 35,5$ g/mol

- a) 0,179
- b) 0,22
- c) 0,42
- d) 2,38
- e) 4,52

08. (VUNESP-SP) Considere o equilíbrio a 25°C:

Conhecendo-se as concentrações iniciais: $[\text{PCl}_5]_i = 0,100$ mol/L; $[\text{Cl}_2]_i = 0,020$ mol/L; $[\text{PCl}_3]_i = 0$ e a constante de equilíbrio ($K_c = 0,030$ mol/L) para a decomposição do PCl_5 à mesma temperatura, a concentração de PCl_5 no equilíbrio é igual a:

- a) 0,035
- b) 0,050
- c) 0,065
- d) 0,120
- e) 0,230

GABARITO

01. [D]

	NH_3	$\rightleftharpoons$	$1/2 \text{N}_2$	+	$3/2 \text{H}_2$
Início	1 mol		0		0
Reage	0,5 mol		0,25 mol		0,75 mol
Equilíbrio	0,5 mol		0,25 mol		0,75 mol

02. [D]

	2SO_2	+	O_2	$\rightleftharpoons$	2SO_3
Início	6 mols/L		5 mols/L		0
Reagem	4 mols/L		2 mols/L		4 mols/L
Equilíbrio	2 mols/L		3 mols/L		4 mols/L

$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{(4)^2}{(2)^2 \cdot (3)} = 1,33$$

03. [C]

	N_2O_4	$\rightleftharpoons$	2NO_2
Início	0,750 mol/L		0
Reage	0,03 mol/L		0,060 mol/L
Equilíbrio	0,72 mol/L		0,060 mol/L

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_{\text{inicial}} = \frac{1,50}{2} = 0,75 \text{ mol/L}$$

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0,06)^2}{(0,72)} = 5 \cdot 10^{-3}$$

04. [C]

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
Início	1 mol/L		1 mol/L		0
Reage	x		x		-
Forma	-		-		2x
Equilíbrio	1-x		1-x		2x

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]} \rightarrow 10^2 = \frac{(2X)^2}{(1-X) \cdot (1-X)} \rightarrow 10 = \frac{2X}{1-X} \rightarrow X = \frac{5}{6} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1 - X = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{HI}] = 2X = 2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{3} \text{ mol.L}^{-1}$$

05. [C]

	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OOH}$	$\rightleftharpoons$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OOC}_2\text{H}_5$	+	H_2O
Início	1 mol		1 mol		0		0
Reage	x mol		x mol		x mol		x mol
Equilíbrio	(1-x) mol		(1-x) mol		x mol		x mol

$$K_c = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{OOC}_2\text{H}_5] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{OOH}]}$$

$$K_c = \frac{x \cdot x}{(1-x) \cdot (1-x)} \Rightarrow 4 = \frac{x^2}{(1-x)^2} \Rightarrow \sqrt{4} = \sqrt{\frac{x^2}{(1-x)^2}} \Rightarrow 2 = \frac{x}{1-x} \Rightarrow x = 1/3 \text{ mol}$$

06. [C]

	2SO_3	$\rightleftharpoons$	2SO_2	+	O_2
Início	5mols		0		0
Reage/Forma	3mols		3mols		1,5mols
Equilíbrio	2mols		3mols		1,5mols

Calculando o valor de K_c para a reação:

$$K_c = \frac{[3,0]^2 \cdot [1,5]}{[2,0]^2} = 3,375$$

07. [C]

Calculando o número de mol de Cl_2 no equilíbrio: $n = \frac{m}{M} = \frac{33,4}{71} = 0,47 \text{ mol}$

Para um volume de 1 dm^3 temos: $[\text{Cl}_2] = \frac{n}{V} = \frac{0,47 \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} = 0,47 \text{ M}$

	PCl_5	$\rightleftharpoons$	PCl_3	+	Cl_2
Início	1M		0		0
Reage/Forma	0,47M		0,47M		0,47M
Equilíbrio	0,53M		0,47M		0,47M

Calculando o valor de K_c para a reação:

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{(0,47) \cdot (0,47)}{(0,53)} = 0,42$$

08. [C]

	PCl_5	$\rightleftharpoons$	PCl_3	+	Cl_2
Início	0,1M		0		0,02M
Reage/Forma	X		X		X
Equilíbrio	0,1-X		X		0,02+X

Calculando o valor de X:

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} \rightarrow 0,03 = \frac{X \cdot (0,02+X)}{(0,1-X)} \rightarrow 0,03 \cdot (0,1-X) = 0,02X + X^2 \rightarrow X^2 + 0,05X - 0,003 = 0$$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-0,05 \pm \sqrt{(0,05)^2 - 4 \cdot (-0,003)}}{2} = \frac{-0,05 + 0,12}{2} = 0,035 \text{ mol.L}^{-1}$$

Com isso temos: $[\text{PCl}_5]_{\text{equilíbrio}} = 0,1 - X = 0,1 - 0,035 = 0,065 \text{ mol.L}^{-1}$